

**Etapa Județeană și a Municipiului București, 12 Martie 2011**  
**CLASA a XII-a**  
**SOLUȚII ȘI BAREMURI ORIENTATIVE**

**Problema 1.** Arătați că numărul  $\frac{1}{\pi} \int_{\sin \frac{\pi}{13}}^{\cos \frac{\pi}{13}} \sqrt{1-x^2} dx$  este rațional.

**Soluție.** Considerăm funcția  $F : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(t) = \int_{\sin t}^{\cos t} \sqrt{1-x^2} dx$ .  
 Această funcție este derivabilă, iar derivata ei este

$$F'(t) = (-\sin t)\sqrt{1-(\cos t)^2} - (\cos t)\sqrt{1-(\sin t)^2} = -(\sin t)^2 - (\cos t)^2 = -1.$$

..... 4 puncte

Deci  $F(t) = -t + k$ ,  $k \in \mathcal{C}$ . Întrucât  $F(\pi/4) = 0$ , rezultă  $k = \pi/4$ , deci  $F(t) = \pi/4 - t$ . Prin urmare,  $F(\pi/13)/\pi = (\pi/4 - \pi/13)/\pi = 9/52$ , care este rațional. .... 3 puncte

**Problema 2.** Fie  $G$  mulțimea matricelor de forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{Z}_7, \quad a \neq \hat{0}.$$

- (a) Arătați că  $G$  este grup în raport cu înmulțirea matricelor.
- (b) Arătați că nu există morfisme nenule de la grupul  $G$  în grupul aditiv  $\mathbb{Z}_7$ .

**Soluție. (a)** Fie

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad B = \begin{pmatrix} x & y \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$$

două matrice din  $G$ . Atunci

$$AB = \begin{pmatrix} ax & ay + b \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \in G,$$

deoarece  $ax \neq \hat{0}$ . Înmulțirea matricelor este asociativă,  $I_2 \in G$  și inversa matricei  $A$  este

$$\begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}b \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \in G.$$

..... 3 puncte

**(b)** Fie

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix},$$

o matrice din  $G$ , cu  $a \neq \hat{1}$ . Cum

$$A^k = \begin{pmatrix} a^k & b(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + 1) \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix},$$

rezultă că  $A^6 = I_2$ . Fie  $f$  un morfism de la  $G$  în  $\mathbb{Z}_7$ . Atunci  $\hat{0} = f(I_2) = f(A^6) = \hat{6}f(A)$ , deci  $f(A) = \hat{0}$ . Cum  $K = \{X : X \in G, f(X) = \hat{0}\}$  este subgrup cu cel puțin 36 de elemente, iar  $G$  are 42 de elemente, rezultă  $K = G$ . Deci  $f(X) = \hat{0}$ , oricare ar fi  $X \in G$ . ..... 4 puncte

**Problema 3.** Fie funcția  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continuă și crescătoare și șirul  $(a_n)_{n \geq 1}$  definit astfel

$$a_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{2^n} f\left(\frac{k}{2^n}\right),$$

pentru orice  $n \geq 1$ .

a) Arătați că șirul  $(a_n)_{n \geq 1}$  este descrescător.

b) Știind că există  $p \in \mathbb{N}^*$  astfel încât  $a_p = \int_0^1 f(x)dx$ , arătați că  $f$  este constantă.

**Soluție.** a)

$$a_{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^{2^{n+1}} f\left(\frac{k}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2^{n+1}} \left( \sum_{k=1}^{2^n} f\left(\frac{k}{2^n}\right) + \sum_{k=1}^{2^n} f\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) \right)$$

Deoarece  $f\left(\frac{2k-1}{2^{n+1}}\right) \leq f\left(\frac{k}{2^n}\right)$ , rezultă că

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{2^n} f\left(\frac{k}{2^n}\right) = a_n.$$

..... 4 puncte

b) Fie  $k \in \{1, 2, \dots, 2^p\}$  și  $c \in \left(\frac{k-1}{2^p}, \frac{k}{2^p}\right)$  și diviziunea  $\Delta = (0, \frac{1}{2^p}, \dots, \frac{k-1}{2^p}, c, \frac{k}{2^p}, \dots, 1)$ . Dacă  $S$  este suma superioară Darboux asociată acestei diviziuni, vom avea

$$a_p - S = \frac{1}{2^p} f\left(\frac{k}{2^p}\right) - f(c) \left(c - \frac{k-1}{2^p}\right) - f\left(\frac{k}{2^p}\right) \left(\frac{k}{2^p} - c\right) = (f\left(\frac{k}{2^p}\right) - f(c)) \left(c - \frac{k-1}{2^p}\right) \geq 0.$$

Cum  $\int_0^1 f(x)dx \leq S \leq a_p = \int_0^1 f(x)dx$ , rezultă că  $a_p = S$ , deci  $f(c) = f\left(\frac{k}{2^p}\right)$ . Așadar  $f$  este constantă pe toate intervalele  $\left(\frac{k-1}{2^p}, \frac{k}{2^p}\right]$ ,  $k = 1, 2, \dots, 2^p$  cu reuniunea intervalul  $[0, 1]$ . Din continuitate rezultă  $f$  constantă.

..... 3 puncte

**Problema 4.** Fie  $A$  un inel și  $a$  un element al său. Arătați că:

(a) Dacă  $A$  este comutativ și  $a$  este nilpotent, atunci  $a + x$  este inversabil, oricare ar fi elementul inversabil  $x \in A$ .

(b) Dacă  $A$  este finit și  $a + x$  este inversabil, oricare ar fi elementul inversabil  $x \in A$ , atunci  $a$  este nilpotent.

(Un element  $a$  al unui inel se numește *nilpotent*, dacă există un număr întreg  $n \geq 1$ , astfel încât  $a^n = 0$ .)

**Soluție.** (a) Fie  $x$  un element inversabil și  $n$  un număr întreg strict pozitiv, astfel încât  $a^n = 0$ . Întrucât  $a + x = x(x^{-1}a + 1)$ , este suficient să arătăm că  $x^{-1}a + 1$  este inversabil. Fie  $b = x^{-1}a$ . Inelul  $A$  fiind comutativ, rezultă că  $b^n = x^{-n}a^n = 0$ , deci și  $b^{2n+1} = 0$ . Prin urmare,

$$1 = b^{2n+1} + 1 = (b + 1)(b^{2n} - b^{2n-1} + \dots - b + 1),$$

i. e.,  $b + 1$  este inversabil. .... 3 puncte

(b) Demonstrăm prin inducție că  $a^n - 1$  este inversabil, oricare ar fi numărul întreg  $n \geq 1$ . Luând  $x = -1$ , rezultă că  $a - 1$  este inversabil. Presupunem că  $b = a^n - 1$  este inversabil. Din ipoteză rezultă că și  $a - b^{-1}$  este inversabil, deci și  $ab - 1 = (a - b^{-1})b$  este inversabil. Prin urmare,

$$a^{n+1} - 1 = a + (a(a^n - 1) - 1) = a + (ab - 1)$$

este inversabil.

Întrucât  $A$  este finit, există două numere întregi  $q > p \geq 1$ , astfel încât  $a^p = a^q$ , i. e.,  $a^p(a^{q-p} - 1) = 0$ . Elementul  $a^{q-p} - 1$  fiind inversabil, rezultă că  $a^p = 0$ . .... 4 puncte