

Olimpiada Națională de Matematică

Etapa Județeană și a Municipiului București, 9 Martie 2013

SOLUȚII ȘI BAREME ORIENTATIVE – CLASA a XI-a

Problema 1. Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un sir crescător și mărginit. Calculați

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - a_1 - a_2)(2a_n - a_2 - a_3) \cdots (2a_n - a_{n-2} - a_{n-1})(2a_n - a_{n-1} - a_1).$$

Soluție. Notăm

$$x_n = (2a_n - a_1 - a_2)(2a_n - a_2 - a_3) \cdots (2a_n - a_{n-2} - a_{n-1})(2a_n - a_{n-1} - a_1).$$

Sirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este convergent; fie $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Avem $a_n \leq L$, oricare ar fi $n \geq 1$.

..... 1p

Atunci $2a_n - a_k - a_{k+1} \leq 2L - a_k - a_{k+1} \leq 2(L - a_k)$, $k = 1, 2, \dots, n-2$,

..... 1p

deci $0 \leq x_n \leq 2^{n-1}(L - a_1)(L - a_2) \cdots (L - a_{n-2})(L - a_1) = y_n$. Presupunem că $y_n > 0$, în caz contrar $y_n = 0$ și apoi $x_n = 0$.

..... 2p

Cum $\frac{y_{n+1}}{y_n} = 2(L - a_n) \rightarrow 0$,

..... 1p

din criteriul raportului deducem că $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.

..... 1p

Din criteriul cleștelui obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

..... 1p

Problema 2. Fie matricele de ordin 2 cu elemente reale A și B astfel încât

$$AB = A^2B^2 - (AB)^2 \quad \text{și} \quad \det(B) = 2.$$

a) Arătați că matricea A nu este inversabilă.

b) Calculați $\det(A + 2B) - \det(B + 2A)$.

Soluție. a) Avem $A(AB - BA - I_2)B = O_2$, de unde

$$A(AB - BA - I_2) = O_2,$$

deoarece B este inversabilă. Presupunând că matricea A este inversabilă, rezultă $AB - BA = I_2$, fals, deoarece $\text{tr}(AB - BA) = 0 \neq 2 = \text{tr}(I_2)$.

..... 2p

b) Fie $f(x) = \det(A + xB)$, unde $x \in \mathbb{R}$. Deoarece $\det(A) = 0$, există $a \in \mathbb{R}$ astfel ca $f(x) = ax + \det(B)x^2 = 2x^2 + ax$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

..... 2p

Avem $\det(A + 2B) - \det(B + 2A) = f(2) - 4f(1/2)$.

..... 2p

Atunci $\det(A + 2B) - \det(B + 2A) = 8 + 2a - 4(1/2 + a/2) = 6$.

..... 1p

Problema 3. Fie A o matrice neinversabilă de ordin n , $n > 1$, cu elemente în mulțimea numerelor complexe, toate elementele având modulul egal cu 1.

a) Arătați că pentru $n = 3$, două dintre liniile sau două dintre coloanele matricei A sunt proporționale.

b) Rămâne adevărată concluzia de la punctul anterior pentru $n = 4$?

Soluție. a) Scoatem factor comun de pe fiecare linie primul element al său. Repetăm procedeul de pe fiecare coloană, obținând o matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & c & d \end{pmatrix},$$

cu a, b, c, d numere complexe de modul 1.

Condiția $\det(A) = 0$ revine la $(a-1)(d-1) = (b-1)(c-1)$.

..... 2p

Conjugând, obținem $\overline{ad}(a-1)(d-1) = \overline{bc}(b-1)(c-1)$. Dacă $(a-1)(d-1) = 0$, atunci $(b-1)(c-1) = 0$, deci două linii sau două coloane sunt egale cu $(1 \ 1 \ 1)$ și problema este rezolvată.

..... 2p

Dacă $(a-1)(d-1) = (b-1)(c-1) \neq 0$, atunci $\overline{ad} = \overline{bc}$, deci $ad = bc$. Din $(a-1)(d-1) = (b-1)(c-1)$ rezultă $a+d = b+c$, prin urmare $\{a, d\} = \{b, c\}$ sau $a = b = c = d$. Rezultă că ultimele două linii sau coloane sunt egale, de unde obținem cerința.

..... 1p

b)¹ Matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & i & -i \\ 1 & -i & 1 & -i \\ 1 & i & i & -1 \end{pmatrix}$ are determinantul nul și are orice

două linii (coloane) neproporționale, deci concluzia nu mai rămâne adevărată pentru $n = 4$.

..... 2p

Problema 4. Se consideră o funcție monotonă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

a) Demonstrați că f are limite laterale în fiecare punct $x_0 \in \mathbb{R}$.

b) Definim funcția $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \lim_{t \nearrow x} f(t)$, i.e. $g(x)$ este limita la stânga în punctul x . Arătați că dacă funcția g este continuă, atunci funcția f este continuă.

Soluție. Vom presupune că funcția f este monoton crescătoare.

a) Fie $x_0 \in \mathbb{R}$. Mulțimea $\{f(x) \mid x < x_0\}$ este mărginită superior de $f(x_0)$, conform monotoniei funcției f . Notăm cu $L = \sup\{f(x) \mid x < x_0\}$ și arătăm că $L = f(x_0 - 0)$.

¹Exemplul se obține astfel: minorul elementului din colțul stânga sus al matricei obținute prin scăderea primei linii din celelalte trei linii este un determinant al unei matrice antisimetrice.

..... 1p

Într-adevăr, fie $\varepsilon > 0$; există $a < x_0$ astfel încât $f(a) > L - \varepsilon$, deoarece $L = \sup\{f(x) \mid x < x_0\}$. Din monotonie rezultă $|f(x) - L| = L - f(x) < \varepsilon$, oricare ar fi $x \in (a, x_0)$, de unde $L = f(x_0 - 0)$.

..... 1p

Analog se arată că f are limită la dreapta în orice punct din \mathbb{R} .

b) Fie $x_0 \in \mathbb{R}$ și fie numerele $t, s, a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât $t < a < x_0 < s < b$. Atunci $f(t) \leq f(a) \leq f(x_0) \leq f(s) \leq f(b)$.

..... 1p

Atunci $g(a) = \lim_{t \nearrow a} f(t) \leq f(x_0)$ și $g(b) = \lim_{s \nearrow b} f(s) \geq f(x_0)$, adică

$$g(a) \leq f(x_0) \leq g(b).$$

..... 2p

Cum a, b sunt alese arbitrar, din continuitatea funcției g avem $g(x_0) = \lim_{a \nearrow x_0} g(a) = \lim_{b \searrow x_0} g(b)$, deci $g(x_0) \geq f(x_0) \geq g(x_0)$, adică $g(x_0) = f(x_0)$. Prin urmare $f = g$, de unde rezultă concluzia.

..... 2p

Observație. Se pot acorda maximum 1 punct la a) și maximum 2 puncte la b) dacă raționamentele intuitive sau pe un desen pot fi transcrise riguroș în limbajul analizei matematice corecte.