

Olimpiada Națională de Matematică

Etapa Județeană și a Municipiului București, 9 Martie 2013


CLASA a VI-a

**Problema 1.** Se consideră triunghiul echilateral  $ABC$  și punctul  $D$  pe semidreapta opusă semidreptei  $(BC)$ , astfel încât  $[DB] \equiv [BC]$ . Considerăm punctul  $E$  în semiplanul determinat de dreapta  $AD$  ce nu conține punctul  $B$ , astfel încât distanța de la  $E$  la  $AB$  este egală cu  $EA$ , distanța de la  $E$  la  $DC$  este egală cu  $ED$  și  $EA = ED$ , iar punctul  $F$  astfel ca  $D \in (BF)$  și  $[FD] \equiv [BC]$ .

- a) Demonstrați că  $\triangle FDE \equiv \triangle BAE$ .
- b) Arătați că  $[EB]$  este bisectoarea unghiului  $\widehat{AED}$ .

*Gazeta Matematică*

**Soluție:**



- a)  $[FD] \equiv [AB]$  (ambele sunt congruente cu  $[BC]$ )
- $[DE] \equiv [AE]$  (din ipoteză)
- $\widehat{FDE} \equiv \widehat{BAE}$  (fiecare are  $90^\circ$ ) ..... **3 p**
- Din cele trei relații rezultă  $\triangle FDE \equiv \triangle BAE$  ..... **1 p**
- b)  $\triangle BAE \equiv \triangle BDE$  conform cazului L.L.L.
- Din această congruență obținem  $\widehat{AEB} \equiv \widehat{DEB}$  ..... **2 p**
- De aici concluzia  $[EB]$  este bisectoarea  $\widehat{AED}$  ..... **1 p**

**Problema 2.** Determinați câte numere de opt cifre conțin în scrierea lor secvența "2013". (un exemplu de astfel de număr este 31020135)

- Soluție:** Numerele pot avea una din formele: (1)  $\overline{2013abcd}$ , (2)  $\overline{a2013bcd}$ ,  
(3)  $\overline{ab2013cd}$ , (4)  $\overline{abc2013d}$ , (5)  $\overline{abcd2013}$  ..... **1p**  
Pentru (1) avem  $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$  numere ..... **1p**

Pentru fiecare din cazurile (2), (3), (4) și (5) avem  $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$   
 numere ..... **3p**  
 Numărul 20132013 apare de două ori; la (1) și la (5)  
 Numărul de numere este 45999 ..... **2 p**

**Problema 3.** a) Arătați că 30007 este număr compus.

b) Arătați că șirul: 37, 307, 3007, ...,  $3 \underbrace{00\dots0}_{de\ n\ ori} 7, \dots$  conține o infinitate  
 de termeni care sunt numere compuse.

**Soluție:** a) Constatăm că  $30007 = 37 \cdot 811$ , așadar 30007 este număr  
 compus. .... **3 p**

b) Arătăm că pentru  $n = 3k$  numărul  $3 \underbrace{00\dots0}_{de\ 3k\ ori} 7$  este compus. Scriem  
 $3 \underbrace{00\dots0}_{de\ 3k\ ori} 7 = 3 \cdot 10^{3k+1} + 7 = 30 \cdot 10^{3k} + 7$  ..... **2 p**  
 $30 \cdot 10^{3k} + 7 = 30 \cdot 1000^k + 7 = 30 \cdot (999 + 1)^k + 7 = 30 \cdot (\mathcal{M}37 + 1) + 7 =$   
 $\mathcal{M}37 + 37 = \mathcal{M}37$ ..... **2 p**

*Notă: Verificarea unor cazuri particulare (30000007, 3000000007) și  
 afirmația că pentru  $n = 3k$  obținem numere compuse se acordă 1 punct.*

**Problema 4.** Se consideră numărul natural  $n$ ,  $n \geq 10$  și mulțimea  
 $A = \{1, 2, 3, \dots, 3n\}$ . Spunem că mulțimea nevidă  $X$ ,  $X \subset A$  are propri-  
 etatea  $\mathcal{P}$  dacă oricare ar fi  $x \in X$  și  $y \in X$ ,  $x > y$ , numărul  $x + y$  nu se  
 divide cu numărul  $x - y$ .

a) Dați un exemplu de mulțime  $X$  cu proprietate  $\mathcal{P}$  care conține numerele  
 4 și 14 și care are cel puțin trei elemente.

b) Demonstrați că există cel puțin o mulțime cu proprietatea  $\mathcal{P}$  care are  
 exact  $n$  elemente.

c) Arătați că nu există o mulțime cu proprietatea  $\mathcal{P}$  care să aibă  $n$   
 elemente și să conțină numerele 4 și 14.

**Soluție:** a) Un posibil exemplu este  $X = \{4, 14, 9\}$

Verificarea exemplului ..... **1 p**

b) Mulțimea  $X$  nu poate conține numere consecutive și, deasemenea nu  
 poate conține numere de aceeași paritate consecutive ..... **2p**

Prin urmare, diferența minimă dintre două numere din  $X$  este cel puțin  
 egală cu 3. Dacă diferența minimă este 3, mulțimea  $X$  are număr maxim  
 de elemente egal cu  $n$ . De exemplu  $X_1 = \{1, 4, 7, \dots, 3n - 2\}$  și  $X_2 =$   
 $\{2, 5, 8, \dots, 3n - 1\}$  verifică cerințele problemei. (*este suficient un exemplu*)

**2 p**

c) Fie  $Y$  cu proprietatea  $\mathcal{P}$  astfel încât  $4 \in Y, 14 \in Y$ . Cum  $x, y \in Y, x <$   
 $y$ , implică  $y - x \geq 3$ , rezultă că în  $Y$  sunt cel mult  $n - 5$  elemente mai mari  
 ca 14 și cel mult un element mai mic ca 4. Fie  $a, b \in Y$  cu  $4 < a < b < 14$ .  
 Atunci  $a \geq 7, b \leq 11$ . Dacă  $a = 7$  atunci  $14 - 7$  ar divide  $14 + 4$ , fals. Prin  
 urmare între 4 și 14 există cel mult un element al lui  $Y$ . În concluzie  $Y$  ar  
 avea cel mult  $1 + 2 + 1 + n - 5 = n - 1$  elemente, fals. .... **2 p**